

## FICHA PRODUCTO

### Paclitaxel 300 mg / 50 ml

<b>Registro</b>	:	F-23271/16
<b>Nombre</b>	:	PACLITAXEL SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA PERFUSIÓN 300 mg/50 mL
<b>Referencia de Tramite</b>	:	RF801845
<b>Equivalencia Terapéutica</b>	:	
<b>Titular</b>	:	FARMACÉUTICA XENIUS LTDA.
<b>Estado del Registro</b>	:	Vigente
<b>Resolución Inscríbase</b>	:	26039
<b>Fecha Inscríbase</b>	:	27/12/2016
<b>Ultima Renovación</b>	:	
<b>Fecha Próxima renovación</b>	:	27/12/2021
<b>Régimen</b>	:	Importado Terminado
<b>Vía Administración</b>	:	Intravenosa
<b>Condición de Venta</b>	:	Receta Médica
<b>Expende establecimiento tipo</b>	:	Establecimientos Tipo A

**Indicación** : Carcinoma de ovario: Paclitaxel está indicado para el tratamiento de primera línea y posterior para el tratamiento de carcinoma metastásico avanzado de ovario. Paclitaxel está indicado como terapia de primera línea, en combinación con cisplatino. Carcinoma de mama: Paclitaxel está indicado como tratamiento adyuvante de carcinoma de mama nódulo positiva administrado en secuencia con la terapia combinada estándar. Se demostró eficacia solo en pacientes con tumores con receptores negativos para estrógeno y progesterona. Paclitaxel está indicado como terapia de primera línea después de la recaída dentro de los 6 meses de terapia auxiliar. La terapia anterior debe de haber incluido una antraciclina a menos que este clínicamente contraindicado. Paclitaxel está indicado como terapia de primera línea del carcinoma avanzado o metastásico de mama, en combinación con trastuzumab, en pacientes que sobre producen HER-2 a un nivel 2+ o 3+, según lo determinado por la inmunohistoquímica. Paclitaxel está indicado como un agente

único para el tratamiento de carcinoma metastásico de mama en pacientes después del fracaso de la terapia estándar de antraciclina o en aquellos en que la terapia de antraciclina no está indicado. Carcinoma avanzado de células pulmonares no pequeñas: Paclitaxel, en combinación con cisplatino, como terapia de primera línea, está indicado para el tratamiento de carcinoma de células pulmonares no pequeñas (NSCLC) en pacientes quienes no son candidatos para cirugía potencialmente curativa y/o radioterapia. Sarcoma de Kaposi relacionado a SIDA: Paclitaxel está indicado para el tratamiento de segunda línea en pacientes con sarcoma de Kaposi, relacionado a SIDA

