



PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO.
BENSHEIM

GMBH



VADEMÉCUM



XENIUS PHARMA



PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO
GMBH

B E N S H E I M



www.xeniuspharma.cl



PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO.
B E N S H E I M

Con nuestras especialidades ofrecemos al médico general en su hora de consulta una cantidad de posibilidades terapéuticas nuevas. En muchos casos, donde hasta ahora se podía practicar solamente una terapia sintomática, puede ser utilizada ahora una medicina efectiva a través de nuestras especialidades.

La biología del proceso de curación sigue las leyes y experiencias de la homeopatía.

Los componentes que son extraídos en mayor parte de la flora, están combinados en nuestras especialidades para formar una unidad terapéutica.

Por el estímulo medicinal, que se repite varias veces diarias, se estimularán las fuerzas de la propia curación del organismo. En enfermedades agudas, se ha valorado más una dosificación frecuente al principio, por corto tiempo. Cuando se reconozca una mejoría o disminución de la intensidad de los síntomas y sólo entonces, se puede dejar de tomar el medicamento tan frecuentemente. En caso de la toma frecuente de medicamentos es suficiente por lo general tomar 8-10 gotas, y en otro caso 10-15 gotas. Normalmente se mezclan las gotas en algo de agua y se toman con el estómago vacío. Después de la asimilación de los alimentos hay que esperar aproximadamente una hora hasta el inicio de la medicación.

En enfermedades crónicas se necesitan generalmente dosis 2 a 3 veces diarias, 10 a 15 gotas, durante un largo período. Después de una mejoría reconocida se puede reducir la dosis a 1 o 2 veces diarias, pero la medicación se debería continuar aún durante un largo período.

Para la selección del medicamento buscado ayuda la lista por indicaciones y la ubicación del medicamento según su acción por sistemas.

Los componentes de nuestras especialidades son probados en su acción por medio de la investigación administrándolos a personas sanas. Las acciones farmacológicas resultantes, han sido señaladas bajo observaciones clínicas, por medio de claves estratégicas en la descripción de los medicamentos, y que buscan precisamente la indicación terapéutica. En su caracterización por supuesto, han sido nombrados solo aquellos síntomas, que son de interés para la enfermedad determinada - aunque el campo de acción en si es mucho más grande.

Para la prescripción de nuestras especialidades se ofrece a la mayoría de los pacientes de consulta un amplio terreno. También pueden ser tratados con éxito los casos difíciles de diagnosticar, en enfermedades con muchos síntomas. Sobre todo se pueden esperar mejorías agradables o curaciones, cuando las molestias nombradas son iguales a la sintomatología o acción farmacológica de los componentes.

La aplicación de los preparados de nuestras especialidades es fácil de aprender.

Su efecto convence y es a menudo sorprendente. Para los pacientes significan en la mayoría de los casos una novedad agradable.

Todos los preparados son muy tolerables por el estómago, por lo que no puede resultar ningún tipo de molestia tras la medicación.

Published by Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Departamento científico Bensheim
V 01/2004



Indice de Combinados Homeopáticos

R1 ANGINACID Rekin1 Inflammaciones agudas y crónicas	5
Rekin5 GASTREU, TR5 Gastritis y acidez estomacal	7
R6 GRIPFEKTAN, Catarro y gripe	
R7 HEPAGALEN, Rekin7, TR7 Afecciones orgánicas y funcionales del hígado y la vesícula biliar	10
R8 JUTUSSIN, Antitusígeno, broncodilatador y expectorante	12
R10 KLIMAKTERAN, REKIN 10 Climaterio y menopausia	14
R14 QUIETA, Rekin 14, TR14 Estrés, insomnio y ansiedad	16
R18 CYSTOPHYLIN, REKIN 18 Cistitis y nefritis	18
R20 EUGLANDIN - F, Rekin20, Regulación de la función glandular femenina	19
R25 PROSTATAN, Rekin25, Afecciones prostáticas	21
R27 RENOCALCIN, Litiasis renal	23
R37 COLINTESTON, Meteorismo y cólicos intestinales	24
R40 DIAGLUKON, Adyuvante diabetes mellitus	25
R49 RHINOPULSAN, Sinusitis y rinitis	26
R55 RUTAVINE, REKIN 55 Heridas y lesiones, modulador de la inflamación y el dolor	28
R73 SPONDARTHHRIN Rekin 73, Artrosis y espondiolartrosis	30
APETIMAX Anemias crónicas, falta de apetito y convalecencia	31





R1 ANGINACID, REKIN 1, TR1 Inflamaciones agudas y crónicas



Presentaciones: Gotas, Ampollas inyectables.

Composición:

Gotas: Apis D4 1,00 g, Belladonna D4 1,00 g, Calcium iodatum D4 1,00 g, Hepar sulfuris D12 1,00 g, Kalium bichromicum D4 0,01 g, Lachesis D12 1,00 g, Marum verum D6 1,00 g, Mercurius sublimatus corrosivus D5 1,00 g, Phytolacca D4 1,00 g, Ethanolum / Aqua purificata 1,99 g.

Ampollas inyectables: Apis D4 0,2 g, Barium chloratum D6 0,2 g, Belladonna D4 0,2 g, Calcium iodatum D4 0,2 g, Hepar sulfuris D12 0,2 g, Kalium bichromicum D6 0,2 g, Lachesis D12 0,2 g, Marum verum D6 0,2 g, Mercurius sublimatus corrosivus D8 0,2 g, Phytolacca D4 0,2 g, Cloruro de sodio como agente isotónico.

Indicaciones: Inflamaciones agudas y crónicas, amigdalitis, otitis media, inflamaciones linfáticas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al cromo; insuficiencia renal. No debe administrarse a niños menores de 6 años, ni debe utilizarse durante el embarazo ni el período de lactancia. Si existe una enfermedad de la tiroides, no debe utilizarse el preparado sin consultar previamente al médico.

Efectos secundarios: En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el tratamiento. Puede producirse sialorrea después de utilizar el preparado; en este caso, debe suspenderse el tratamiento.

Interacciones: No se han descrito.





Posología:

Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 2-3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas. Niños de 6-12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Apis: Edema inflamatorio, dolores punzantes.

Barium chloratum: Enfriamiento, tumefacción de los ganglios, amigdalitis, catarro crónico nasal.

Belladonna: Enfriamiento, tumefacción de los ganglios, amigdalitis, catarro crónico nasal. Hiperemia inflamatoria, fiebre con dolores de cabeza y piel húmeda.

Calcium iodatum: Amigdalitis crónica infantil, tumefacción de los ganglios en el cuello. Amígdalas hipertróficas y crípticas.

Hepar sulfuris: Tendencia a inflamaciones catarrales. Inflamaciones y erupciones con tendencia a la supuración.

Kalium bichromicum: Exudación plástica de la mucosa, de la laringe y faringe. Ulceraciones de la mucosa. Acción profunda sobre las mucosas que producen secreciones adherentes, viscosas, filamentosas, con formación de falsas membranas y ulceraciones.

Lachesis: Infecciones sépticas, congestión de la garganta, mucosas inflamadas, reseca, dolorosas, de color rojo oscuro. Afecciones crónicas o agudas con tendencia hemorrágica y estados adinámicos.

Marum verum: Adenitis vegetativa, catarro crónico de la cavidad nasal.

Mercurius sublimatus corrosivus: Ulceraciones y secreciones sanguinolentas. Dolores ardorosos en la faringe y el esófago. Deglución dolorosa.

Phytolacca: Hinchazón, oscurecimiento de la laringe, dolores hasta en las orejas. Amígdalas hipertrofiadas.

En casos de:

Bronquitis, consultar también R8.

Pertussis, consultar también R8.

Nefritis, consultar también R27.

Cistitis, pielitis, consultar también R18.

Gripe, consultar también R6.



REKIN 5 GASTREU, TR5 Gastritis y acidez estomacal



Presentación:

Ampollas inyectables y Tabletas.

Composición:

Ampollas inyectables: Anacardium D6 0,2 g, Argentum nitricum D6 0,2 g, Arsenicum album D6 0,2 g, Belladonna D4 0,2 g, Carbo vegetabilis D10 0,2 g, Chamomilla D4 0,2 g, Chelidonium D4 0,2 g, Lycopodium D6 0,2 g, Nux vomica D4 0,2 g, Scrophularia nodosa D3 0,2 g.

Tabletas: Anacardium D6 10 mg, Argentum nitricum D6 10 mg, Arsenicum album D4 10 mg, Belladonna D4 10 mg, Carbo vegetabilis D8 10 mg, Chamomilla D3 10 mg, Chelidonium D3 10 mg, Lycopodium D5 10 mg, Nux vomica D4 10 mg, Scrophularia nodosa D3 10 mg, Exipiente (Carboxymethylcellulose-Natrium/ Magnesiumstearat): 3,8 %

Indicaciones: Gastritis aguda y crónica, dispepsia, acidez, meteorismo.

Posología:

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

Tabletas: Tomar 2 tabletas sublinguales 30 minutos antes de cada comida.





Observaciones farmacológicas y clínicas:

Anacardium: Dolor estomacal con mejoría después de comer. Trastornos digestivos, dispepsia y estreñimiento. Gastropatía nerviosa. Úlcera duodenal y pilórica.

Argentum nitricum: Dolor en el epigastrio. Eructación fuerte. Gastritis. Regurgitación, flatulencia gástrica.

Arsenicum album: Dolores de estómago con vómitos. Curativo de la mucosa. Abdomen doloroso y distendido. Pirosis gástrica.

Belladonna: Sensibilidad de la región gástrica. Gastritis.

Carbo vegetabilis: Pesadez abdominal, debilidad. Flatulencia gástrica excesiva.

Chamomilla: Gastralgias después de cualquier excitación. Gastritis nerviosa.

Chelidonium: Estómago sensible. Dolores epigástricos agudos.

Lycopodium: Pesadez abdominal, cólicos, sabor amargo en la boca.

Nux vomica: Excitación nerviosa e hipocondría. Distensión abdominal.

Scrophularia nodosa: Hiperacidez gástrica que mejora después de comidas. Dolores abdominales agudos. Náuseas con debilidad y opresión en el epigastrio.

En casos de:

Afecciones al hígado simultáneas, consulta también R7.

Cólicos, consultar R37.



R6 GRIPFEKTAN

Catarro y gripe

Presentación: Gotas.

Composición:

Gotas: *Aconitum D4 1 g, Baptisia D4 1 g, Bryonia D4 1 g, Camphora D4 1 g, Causticum Hahnemanni D6 1 g, Eucalyptus D4 1 g, Eupatorium perfoliatum D4 1 g, Ferrum phosphoricum D8 1 g, Gelsemium D6 1 g, Sabadilla D6 1 g.*

Indicaciones: Infección gripal y catarral.

Posología:

Gotas: En procesos agudos que cursan con fiebre tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3-4 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Niños de 6-12 años, tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Aconitum: Fiebre y resfriado con inquietud y miedo, piel seca e hiperémica.

Baptisia: Fiebre tífica, ensordecimiento, sensación de cansancio, resfriado, excitación de la mucosa.

Bryonia: Fiebre catarral con dolores de cabeza, punzadas al moverse y respirar, piel seca y serosa, tos irritante, sed.

Camphora: Analéptico, calmante. Rinitis violenta, neumonía.

Causticum Hahnemanni: Mucosa nasal irritada, tos profunda. Afonía, hipersensibilidad en la laringe y la traquea. Catarros bronquiales.

Eucalyptus: Dolor de cabeza con fiebre, mucosa irritada. Influenza y catarro gripal, traqueitis, laringitis, bronquitis y bronquiolitis

Eupatorium perfoliatum: Fiebre con cansancio general. Inflamaciones de la nariz y de las vías respiratorias altas, mucosa nasal irritada.

Ferrum phosphoricum: Curativo de fiebre e inflamaciones, pulso lento, inflamaciones de las vías respiratorias altas, bronconeumonía.

Gelsemium: Cansancio con dolor de cabeza, fiebre. Cara congestionada, roja, caliente.

Sabadilla: Tos irritante con estornudos. Acción sobre las mucosas de la nariz y de la garganta.

En casos de:

Angina, consultar también R1. Bronquitis, consultar también R8.





R7 HEPAGALEN, REKIN 7, TR7

Afecciones orgánicas y funcionales del hígado y la vesícula biliar



Presentación: Gotas , Ampollas inyectables y Tabletas.

Composición:

Gotas: Carduus marianus D4 1 g, Chelidonium D 4 1 g, China D4 1 g, Cholesterinum D6 1 g, Colocynthis D6 1 g, Lycopodium D4 1 g, Nux vomica D4 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 3 g.

Ampollas inyectables: Carduus marianus D4 0,2 g, Chelidonium D4 0,2 g, China D4 0,2 g, Cholesterinum D6 0,2 g, Colocynthis D6 0,2 g, Lycopodium D6 0,2 g, Nux vomica D4 0,2 g, Isotonic NaCl solution 0,6 g.

Tabletas: Carduus marianus D4 14,3 mg, Chelidonium D 4 14,3 mg, China D4 14,3 mg, Cholesterinum D6 14,3 mg, Colocynthis D6 14,3 mg, Lycopodium D4 14,3 mg, Nux vomica D4 14,3 mg, Ekipiente (Carboxymethylcellulose-Natrium/ Magnesiumstearat): 3,8 %

Indicaciones: Desórdenes orgánicos y funcionales del hígado y vesícula biliar. Medicación de apoyo en casos de hepatitis.

Posología:

Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 4-6 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.



Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

Tabletas: Tomar de 1 a 2 tabletas 3 veces al día

Niños 0 a 6 años: 1 tableta sublingual, 30 minutos antes de cada comida. **Ma-**

yores de 6 años: 2 tabletas sublinguales, 30 minutos antes de cada comida.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Carduus marianus: Pesadez abdominal, cólicos, náuseas, vómitos. Estímulo de la función hepáticas y biliares en trastornos hepáticos como hepatitis crónica.

Chelidonium: Curativo del hígado y la vesícula biliar. Sensación de dolor en el omoplato derecho, sabor amargo en la boca, inapetencia, náuseas.

China: Debilidad y mareos con sudor, meteorismo, indigestión al ingerir frutas, eructos frecuentes. Afecciones orgánicas y funcionales del hígado.

Cholesterinum: Hipertrofia del hígado, ictericia, colecistitis.

Colocynthis: Cólicos hepáticos con mejoría al presionar, meteorismo.

Lycopodium: Hipertrofia del hígado, meteorismo y flatulencia. Hepatopatías en general. Colangitis, colecistitis.

Nux vomica: Dolores en el epigastrio al presionar en el estómago, temperamento colérico. Alteraciones gástricas e intestinales y hepatobiliares diversas.

En casos de:

Enfermedades del estómago y úlceras, consultar también R5.

Colecistitis, complementar con R1.

Cólicos hepáticos y espasmos consultar también R37.





R8 JUTUSSIN

Expectorante, broncodilatador y antitusígeno

Presentación: Jarabe.

Composición:

Jarabe: Ammonium causticum D2 1,00 g, Belladonna D2 1,00 g, Bryonia D2 1,00 g, Chamomilla D2 3,00 g, Coccus cacti D5 1,00 g, Corallium rubrum D10 1,00 g, Cuprum aceticum D10 1,00 g, Drosera D2 1,00 g, Ipecacuanha D3 1,00 g, Thymus vulgaris D2 3,00 g, Saccharum 40,00 g, Saccharum tostum 0,26 g, Ethanolum / Aqua purificata ad 100,00 g.

Indicaciones:

Rino-laringofaringitis, bronquitis y tos.

Posología:

Jarabe: Tomar una cucharadita cada 2 horas hasta un máximo de 6 al día, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría tomar 1 cucharadita 3 veces al día.

Bebes de 0-12 meses y niños de 2-5 años: tomar 1/4 cucharadita mezclada con 3 cucharaditas de leche materna, hasta un máximo de 4 al día.

Niños de 6-12 años: tomar 1/2 cucharadita hasta un máximo de 6 al día. Si se aprecia mejoría hasta un máximo de 3 veces al día.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Ammonium causticum: Fuerte irritación de la laringe, sensación de ardor e hipersensibilidad de la mucosa, ronquera, tos grave e incesante acompañada de dificultad para respirar. Bronquitis, rinofaringitis.

Belladonna: Tos espasmódica, tos profunda, mucosa seca. Bronquitis y bronconeumonía

Bryonia: Tos seca irritante con dolor en el pecho. Congestión pulmonar, enfisema, tuberculosis.

Chamomilla: Irritación de la laringe, hipersensibilidad de la traquea, tos incesante o frecuente, ronquera, empeoramiento de los síntomas durante la noche y mejora a través de la transpiración.





Coccus cacti: Ataques de tos con vómitos, mucosas viscosa. Irritación de las vías respiratorias con tendencia a las hemorragias.

Corallium rubrum: Acción sobre las mucosas respiratorias. Tos espasmódica fuerte acompañada de asfixia.

Cuprum aceticum: Ataques de tos graves con sofocamiento y sensación de presión en el pecho, espasmos broncomusculares con colapsos y cianosis. Espasmos y contracciones de la musculatura respiratoria: asma bronquial, tos ferina, laringitis estridulosa

Drosera: Acción profunda sobre las vías respiratorias. Tuberculosis. Laringitis aguda y crónica. Tos permanente, especialmente durante la noche, con garganta seca y punzadas en el pecho. Espujo hemoptoico, náuseas al toser.

Ipecacuanha: Tos seca asfixiante con malestares y vómitos.

Thymus vulgaris: Expectorante. Trastornos respiratorios crónicos.

En casos de:

Los siguientes medicamentos se pueden alternar o adicionar.

En caso de Gripe, con R6.

En caso de Angina, con R1.





R10 KLIMAKTERAN, REKIN 10

Climaterio y menopausia



Presentación: Gotas y Ampollas inyectables.

Composición:

Gotas: Acidum sulfuricum D4 1,0 g, Cimicifuga D4 1,0 g, Lachesis D12 1,0 g, Sanguinaria D4 1,0 g, Sepia trit. D4 0,1 g, Ethanolum / Aqua purificata 5,9 g.

Ampollas inyectables: Acidum sulfuricum D4 0,2 g, Cimicifuga D4 0,2 g, Lachesis D12 0,2 g, Sanguinaria D4 0,2 g, Sepia D8 0,2 g, Isotonic NaCl solution 1,0 g.

Indicaciones:

Manifestaciones del climaterio, sofocos, menstruaciones irregulares.

Posología:

Gotas: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. El tratamiento puede prolongarse por un período mayor de tiempo.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

**Observaciones farmacológicas y clínicas:**

Acidum sulfuricum: Sofocos con sudor. Debilidad. Irregularidad menstrual con metrorragia y sangre oscura fluida.

Cimicifuga: Trastornos funcionales endocrinológicos, especialmente en la menopausia. Depresiones y excitaciones. Amenorrea y dismenorrea.

Lachesis: Excitación en la circulación de la sangre a la cabeza. Sensación de sofocamiento que mejora durante la menstruación. Trastornos de la menopausia. Oleadas del climaterio con calor y sudoración caliente.

Sanguinaria: Sensación de congestión de sangre y sudor hasta la cabeza, dolores de cabeza, dismenorrea.

Sepia: Efecto hormonal y venoso, bajo rendimiento físico, indiferencia y debilidad. Oleadas de calor seguidas de sudor, irritación y menstruación irregular. Depresión climatérica.

En casos de:

Otros desordenes hormonales femeninos se recomienda asociar con R20 Euglandin - F.



R14 QUIETA, REKIN 14, TR14

Estrés, Insomnio y ansiedad



Presentación: Gotas, Tabletas y Ampollas inyectables.

Composición:

Gotas: Avena sativa D4 1 g, Chamomilla D4 1 g, Coffea D4 1 g, Eschscholzia californica D4 1 g, Humulus lupulus D4 1 g, Ignatia D6 1 g, Passiflora incarnata D4 1g, Valeriana D4 1 g, Zincum valerianicum D6 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 1 g.

Tabletas: Ammonium bromatum D3 10 mg, Avena sativa D3 10 mg, Chamomilla D410 mg, Coffea D4 10 mg, Eschscholzia D3 10 mg, Humulus lupulus D3 10 mg, Ignatia D6 10 mg, Passiflora incarnata D4 10 mg, Valeriana D4 10 mg, Zincum valerianicum D6 10 mg, Exipiente (Carboxymethylcellulose-Natrium/ Magnesiumstearat): 3,8 %.

Ampollas inyectables: Ammonium bromatum D4 0,2 g, Avena sativa D3 0,2 g, Chamomilla D4 0,2 g, Coffea D4 0,2 g, Eschscholzia D4 0,2 g, Humulus lupulus D3 0,2 g, Ignatia D6 0,2 g, Passiflora incarnata D3 0,2 g, Valeriana D4 0,2 g, Zincum valerianicum D6 0,2 g.

Indicaciones:

Insomnio, angustia, intranquilidad nerviosa, estados de ansiedad y depresión.



Posología:

Gotas: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Niños de 2-5 años: tomar 3-5 gotas de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Niños de 6-12 años: tomar 5-8 gotas de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Tabletas: Tomar de 1 a 2 tabletas, 3 veces al día.

Niños: 1 tableta sublingual, 30 minutos antes de cada comida.

Mayores de 6 años: 2 tabletas sublinguales, 30 minutos antes de cada comida.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Ammonium bromatum: Ansiedad con onicofagia, timidez, miedo a morir.

Avena sativa: Neurastenia, consecuencias de esfuerzos psíquicos, insomnio.

Chamomilla: Curativo del sistema nervioso excitado y con hipersensibilidad, sueño y querella.

Coffea: Insomnio causado de pensar o después de excitaciones alegres, susto y querella.

Eschscholzia californica: Sedante nervioso en insomnio crónico, y estados de excitabilidad nerviosa.

Humulus lupulus: Sedante. Ansiedad y nerviosismo.

Ignatia: Pesadumbre silenciosa. Cambio de humor, debilidad nerviosa.

Passiflora incarnata: Sedante, excitación e irritabilidad del sistema nervioso.

Valeriana: Sedante. Excitabilidad mental con temblor e inquietud, sueño alterado.

Zincum valerianicum: Insomnio nervioso, contracción de las piernas. Enfermedades hipocondríacas.

En casos de:

Extenuación nerviosa, se complementa con R15.



R18 CYSTOPHYLIN

Cistitis y nefritis

Presentación: Gotas

Composición:

Gotas: Berberis vulgaris D4 1 g, Cantharis D4 1 g, Dulcamara D4 1 g, Equisetum hiemale D6 1 g, Eupatorium purpureum D6 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 5 g.

Indicaciones:

Infecciones crónicas de las vías urinarias y de los riñones. Cistitis.

Posología:

Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

En irritación de la vejiga: tomar 5 -10 gotas, 1 o 2 veces al día.

Niños de 6-12 años: tomar 5-8 gotas disueltas en un poco de agua, de acuerdo con las indicaciones anteriores.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Berberis vulgaris: Rigidez y entumecimiento de la espalda, infecciones de las vías urinarias y nefritis. Cólicos nefríticos. Violento deseo de orinar con disuria.

Cantharis: Dolor irritante al orinar, presencia de sangre en la orina, cistitis aguda. Cistopielonefritis e infecciones urinarias ascendentes.

Dulcamara: Necesidad dolorosa de orinar, orina mucosa y maloliente, resfrío. Cistitis e incontinencia urinaria durante tiempo lluvioso

Equisetum hiemale: Estímulos frecuentes de orinar, dolor en la región renal. Tenesmo vesical y sensación de pesantez que no mejoran con la micción.

Eupatorium purpureum: Dolores de las extremidades y escalofríos, irritación de la uretra. Vejiga irritada.

En casos de:

Nefrolitiasis, complementar con R27, de 10-15 gotas 2 veces al día.

Prostatitis, alternarse con R25.





R20 EUGLANDIN-F, REKIN 20

Regulación de la función glandular femenina



Presentación: Gotas y Ampollas inyectables.

Composición:

Gotas: Glandula suprarenalis (suis) D12 1 g, Glandula thymi (suis) D12 1 g, Hypophysis (suis) D12 1 g, Ovarium (suis) D12 1 g, Pancreas (suis) D12 1 g, Thyreoidinum (suis) D12 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 4 g.

Ampollas inyectables: Glandulae suprarenales D12 0,2 g, Glandula thymi D12 0,2 g, Hypophysis D12 0,2 g, Ovarium D12 0,2 g, Pancreas D12 0,2 g, Thyreoidinum D12 0,2 g, Isotonic NaCl solution 0,8 g.

Indicaciones: Estimulante y regulador de la función glandular femenina.

Posología:

Gotas: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Glándula suprarenalis (suis): Debilidad, enflaquecimiento, miastenia. Estados alérgicos, asma, hipoglicemia, hipertensión-hipotensión.





Glándula thymi (suis): Extenuación. Desórdenes del crecimiento y desarrollo en niños, estímulo de las defensas inespecíficas en enfermedades crónicas y degenerativas.

Hypophysis (suis): Influencia central en todo el sistema central. Desórdenes endocrinos como sobrepeso, obesidad, diabetes insípida, artrosis crónica, alteraciones de las funciones secretoras de tiroides, gonadas y suprarrenales.

Ovarium (suis): Trastornos de la menstruación. Anexitis, dismenorrea, vaginitis.

Páncreas (suis): Diabetes mellitus. Trastornos del fermento digestivo. Hipoglicemia, síndrome de mala absorción.

Thyreoidinum (suis): Regulador de la glándula tiroides, hipotiroidismo, mixedema, sobrepeso, obesidad, bocio tóxico nodular.

Los componentes son producidos y potenciados, en parte, por tejidos de células fetales. Por medio del aumento causado en la superficie se logra un efecto en el sentido del principio de Arntd-Schulz. Así se consigue una influencia terapéutica favorable, que de otra manera presenta trastornos secretivos internos.

En casos de:

Síntomas climatéricos se indica asociar R10 Klimakteran.

Diabetes mellitus se indica en asociación con R40 Diaglukon.



REKIN 25 PROSTATAN

Afecciones prostáticas



Presentación: Ampollas inyectables.

Composición:

Ampollas inyectables: Chimaphila umbellata D5 0,2 g, Clematis vitalba D3 0,2 g, Conium D5 0,2 g, Ferrum picricum D6 0,2 g, Pareira brava D6 0,2 g, Populus tremuloides D4 0,2 g, Pulsatilla D4 0,2 g, Sabal serrulatum D4 0,2 g, Isotonic NaCl solution 0,4 g.

Indicaciones: Coadyudante en prostatitis aguda y crónica. Aumento de la próstata con aparición de síntomas secundarios.

Posología:

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Chimaphila umbellata: Sensación de hinchazón en el periné con hipertrofia prostática. Retención de orina, orina espesa, mucosa y sanguinolenta.

Clematis vitalba: Micción intermitente con interrupción del chorro. Disuria. Escurrimiento urinario.

Conium: Micción débil. Hipertrofia prostática. Polaquiuria nocturna. Prostatitis a consecuencia de infecciones urogenitales.





Ferrum picricum: Nicturia, trastornos de la micción en general. Principal medicamento en la hipertrofia prostática senil.

Pareira brava: Orina sanguinolenta y mucosa, dolor de la uretra. Deseo constante de orinar. Uretritis con dolor agudo durante la micción con secreción purulenta. Populus tremuloides: Relación organotrópica a las vías urinarias. Dolor durante la micción, retención de la orina.

Pulsatilla: Necesidad frecuente de orinar, micción involuntaria. Micción interrumpida y en chorritos como consecuencia de hipertrofia prostática. Ardor en el meato uretral durante y después de la micción.

Sabal serrulatum: Micción difícil, nicturia, polaquiuria. De los medicamentos más importantes en la hipertrofia prostática. Escurrimiento urinario: chorro muy débil.

En casos de:

Prostatitis aguda, se recomienda asociar R1.

Pielitis y cistitis, asociar con R18.

Si se presentan cólicos nefríticos y litiasis renal se indica también R27.





R37 COLINTESTON

Meteorismo y cólicos intestinales

Presentación: Gotas.

Composición:

Gotas: Alumina D12 1 g, Bryonia D4 1 g, Colocynthis D4 1 g, Lycopodium D4 1 g, Nux vomica D6 1 g, Sulfur D12 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 4 g.

Indicaciones: Meteorismo, cólicos intestinales.

Posología:

Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.
Niños 6 a 12 años: tomar 5-8 gotas, de acuerdo con las indicaciones anteriores.



Observaciones farmacológicas y clínicas:

Alumina: Espasmos intestinales, debilidad y tenesmo.

Bryonia: Estreñimiento, mucosa seca. Distensión abdominal con presión y tensión en la región umbilical. Dispepsia. Cólicos localizados en hipocondrio derecho.

Colocynthis: Cólicos, en especial después de emociones e irritaciones. Flatulencia que provoca distensión abdominal dolorosa.

Lachesis: Distención abdominal. Cólico biliar con hepatitis tóxica y absceso.

Lycopodium: Abdomen impulsivo, plenitud gástrica, meteorismo. Formación de cálculos biliares, estreñimiento. Espasmos de la vejiga. Distención abdominal dolorosa con acumulación de gases. Estreñimiento espástico.

Mercurius sublimatus corrosivus: Acción sobre las mucosas digestivas. Abdomen doloroso. Distención. Espasmo intestinal.

Nux vomica: Estreñimiento espasmódico, plétora abdominal, sensación de defecar. Flatulencia abdominal y meteorismo.

Plumbum aceticum: Estreñimiento. Espasmo intestinal. Cólico intestinal y flatulencia por estreñimiento.





Sulfur: Aumenta la reacción física, flatulencia maloliente, diarreas en la mañana.

En casos de:

Cólicos biliares, complementarse o alternarse con R7. Cólicos renales, complementarse o alternarse con R27. Úlcera de duodeno y gastritis, complementarse con R5.





R40 DIAGLUKON

Adyuvante diabetes mellitus

Presentación: Gotas.

Composición:

Gotas: Acidum phosphoricum D12 1 g, Arsenicum album D8 1 g, Lycopodium D30 1 g, Natrium sulfuricum D12 1 g, Secale cornutum D4 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 5 g.

Indicaciones: Tratamiento coadyudante en la diabetes mellitus.

Posología:

Gotas: Como terapia suplementaria tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 2 veces al día. La dosis tiene que estar en concordancia con los niveles de azúcar y los medicamentos alopatícos habituales.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Acidum phosphoricum: Debilidad y extenuación, sed frecuente, orina clara. Diabetes juvenil, diabetes crónica.

Arsenicum album: Sed incalmeable, extenuación progresiva. Diabetes mellitus acompañada de ansiedad, debilidad y agotamiento.

Lycopodium: Estimula la función hepática, pesadez. Poliuria de orina clara. Natrium sulfuricum: Efectivo para la función del hígado y la bilis. Diabetes mellitus con boca seca y deseo de bebidas frías o heladas.

Phaseolus nanus: Hidropesía interna, (ascitis). Orina diabética.

Secale cornutum: Sed incalmeable, parestesia. Desequilibrios circulatorios como claudicación, sobre todo procesos gangrenosos.

Uranium nitricum: Diabetes con sed excesiva, poliuria y lengua seca, adelgazamiento. Diabetes insípida. Acentuada poliuria, con polaquiuria.

En casos de:

Formación de forúnculos, complementarse con R1. Trastornos de la función hepática, complementarse con R7. Climaterio, complementarse con R10.

Como estimulante del sistema glandular, alternarse con R20. Meteorismo y espasmos intestinales, consultar también R37.





R49 RHINOPULSAN

Sinusitis y rinitis

Presentación: Gotas.

Composición:

Gotas: Arsenicum album D12 1 g,
Calcium carbonicum Hahnemanni D30 1 g,
Cinnabaris D12 1 g,
Kalium bichromicum D12 1 g,
Mercurius solubilis Hahnemanni D30 1 g,
Pulsatilla D12 1 g, Sulfur D30 1 g,
Ethanolum / Aqua purificata 3 g.

Indicaciones: Catarro agudo y crónico de la nariz y del seno maxilar, sinusitis; Enfermedades catarrales de las vías respiratorias altas. Pólipos de la fosa nasal, tratamiento postoperatorio en las rinoseptoplastias.

Efectos secundarios:

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto ocurre debe suspenderse el preparado. Puede producirse salivación después de utilizar el preparado; en este caso también, debe suspenderse el tratamiento.

Posología:

Gotas: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 1 o 2 veces al día, salvo prescripción facultativa.

Niños de 6 a 12 años, tomar 5-8 gotas en un poco de agua 1 o 2 veces al día.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Arsenicum album: Eficaz en caso de catarros crónicos de la mucosa. Nariz congestionada después de resfriados.

Calcium carbonicum Hahnemanni: Rinitis hipertrófica, ozena. Catarro frecuente de la mucosa. Catarro nasal hipertrófico, pólipos de la nariz.

Cinnabaris: Medicamento específico, eficaz contra catarros de la fosa nasal. Sinusitis frontal y maxilar. Descarga nasal posterior. Dolor a nivel de la cara dorsal de la nariz.

Kalium bichromicum: Especial en caso de catarros de la garganta y sinusitis. Secreción de mucosa purulenta. Pérdida del olfato. Otorrea con secreción amarillenta.

Mercurius solubilis Hahnemanni: Nariz irritada, mucosa purulenta. Exudación Mercurius solubilis Hahnemanni: Nariz irritada, mucosa purulenta. Exudación





pegajosa. Rinitis recurrente de la infancia, rinitis atrófica. Sinusitis.

Pulsatilla: Catarro de la mucosa con secreciones amarillentas. Pérdida total de olfato y del gusto. Sinusitis dolorosa, esfenoidal, frontal y maxilar.

Sepia: Rinitis y sinusitis. Costras nasales.

Sulfur: Reconstituyente. Inflamación crónica de las mucosas nasales. Costras nasales con tendencia a la hemorragia.

En casos de:

Gripe precedente, completarse con R6.

Afecciones de las amígdalas, consultar también R1.

Bronquitis, consultar también R8.





R55 RUTAVINE, REKIN 55

Heridas y lesiones, modulador de la inflamación y el dolor



Presentación: Gotas y Ampollas inyectables.

Composición:

Gotas: Arnica D4 1 g, Calendula D4 1 g, Hamamelis D4 1 g, Rhus toxicodendron D6 1 g, Ruta D6 1 g, Symphytum D6 1 g, Ethanolum / Aqua purificata 4 g.

Ampollas inyectables: Arnica D4 0,2 g, Belladonna D4 0,2 g, Calendula D3 0,2 g, Echinacea angustifolia D4 0,2 g, Hamamelis D4 0,2 g, Rhus toxicodendron D6 0,2 g, Ruta D6 0,2 g, Symphytum D6 0,2 g, Isotonic NaCl solution 0,4 g.

Indicaciones: Lesiones de todo tipo, fracturas óseas, luxaciones, esguinces, hematomas. Prevención a agresiones (actividades violentas, extracciones dentales, etc.). Patología traumática de partes blandas. Traumatología deportiva. Dolor como agujetas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al zumaque venenoso.

Posología:

Gotas: En cuadros agudos tomar 5 -10 gotas disueltas en un poco de agua, cada 30 minutos salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la toma a 10 gotas 3 veces al día.

El tratamiento puede prolongarse por un periodo mayor de tiempo.





Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Árnica: Cuerpo cansado. Heridas sangrantes, remedio para la resorción en caso de hemorragias. Contusiones post-traumáticas, equimosis provocadas, fracturas óseas, dolores musculares.

Belladona: Inflamación aguda, brusca y violenta. Tumefacción, enrojecimiento, dolor y calor. Espasmo muscular.

Caléndula: De acción especial en caso de heridas contusas y heridas difíciles de curar con destrucción del tejido.

Echinacea angustifolia: Acción sobre sistema linfático en inflamación. Dolor muscular difuso. Dolores musculares difusos. Trastornos de la circulación linfática.

Hamamelis: Dolores y cansancio con relación organotrópica al sistema venoso. Detención de la hemorragia, disminución del dolor y la sensibilidad al contacto.

Rhus toxicodendron: Consecuencias de agotamientos y contusiones. Dolores musculares o tendinosos de origen reumático, infeccioso o como consecuencia de traumatismos. Esguinces y tirones musculares.

Ruta: Cambios de tejido. Inflamaciones ligamentarias y tendinitis secundarias a traumatismos; luxaciones, esguinces y fracturas óseas.

Symphytum: Lesiones de las articulaciones y del periostio. Estimula la formación de los huesos en caso de lesiones. Traumatismo de los huesos y el periostio.

En casos de:

Artrosis, asociar R73.

Se puede asociar R30 en inflamaciones agudas de las articulaciones, los tejidos periarticulares o los músculos aplicando locamente después de un traumatismo.



R73 SPONDARTHIN, REKIN 73

Artrosis y espondiloartrosis



Presentación: Gotas y Ampollas inyectables.

Composición:

Gotas: Acidum sulfuricum D6 2 g, Argentum metallicum D12 1 g, Arnica D4 2 g, Bryonia D4 2 g, Causticum Hahnemanni D12 1 g, Ledum D4 2 g.

Ampollas inyectables: Acidum sulfuricum D6 0,4 g, Argentum metallicum D12 0,2 g, Arnica D4 0,4 g, Bryonia D4 0,4 g, Causticum Hahnemanni D12 0,2 g, Ledum D4 0,4 g, Isotonic NaCl solution.

Indicaciones: Artrosis, particularmente de las articulaciones grandes. Coxartrosis, gonartrosis. Espondiloartrosis.

Posología:

Gotas: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 2 horas, salvo prescripción facultativa. Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

Ampollas inyectables: 1 ampolla 2 veces a la semana por vía parenteral.



Observaciones farmacológicas y clínicas:

Acidum sulfuricum: Dolores de las diferentes articulaciones. Acción específica sobre la formación del cartílago. Debilidad dolorosa y rigidez en rodillas y tobillos. Influencia intensiva del metabolismo del cartílago.

Argentum metallicum: Artralgia y degeneración de las articulaciones. Acción electiva sobre los cartílagos, músculos, tejidos blandos periarticulares. Hipertrofia del cartílago que se acompañan de inflamaciones periarticulares y mialgias.

Arnica: Sensibilidad dolorosa de las articulaciones. Artralgias crónicas y progresivas que provocan debilidad intensa.

Bryonia: Articulaciones inflamadas, rígidas con dolor al moverse, especialmente codo, rodilla, cadera, región sacra, nuca, vértebras cervicales y tobillos. Cauticum Hahnemanni: Deformación de las articulaciones con debilidad y rigidez semejante a la parálisis.

Ledum: Dolores reumáticos de las articulaciones, calambres dolorosos en las caderas. Hidrartrosis de rodilla, gonartrosis.

En casos de:

Como uso externo: R30.

Dolor, añadir R55.





R95 TÓNICO DE ALFALFA

Anemias crónicas, falta de apetito y convalecencia

Presentación: Jarabe.

Composición:

Jarabe: Acidum phosphoricum D2 0,1 g, Avena sativa D2 0,5, Calcium phosphoricum D6 0,1 g, China D2 0,1 g, Cinnamomum D2 0,1 g, Hydrastis D2 0,1 g, Magnesium phosphoricum D6 0,1 g, Alfalfa D2 0,5, Nux vomica D3 1 g, Panax ginseng D2, Ethanolum.

Indicaciones: Anemia, pérdida de apetito, convalecencia, especialmente después de fiebres debilitantes o de intervenciones quirúrgicas, pérdida de peso y en niños para apoyo del crecimiento.

Posología:

Jarabe: Adultos, 1 cucharada 3 veces al día, antes de las comidas,

Niños: 1 cucharadita, 3 veces al día antes de las comidas.

Observaciones farmacológicas y clínicas:

Acidum phosphoricum: Agotamiento físico y psíquico, impotencia, debilidades de la concentración, apatía, cansancio diario.

Alfalfa: Suministra aminoácidos.

Avena sativa: Neurastenia, trabajo excesivo psíquico, debilidad sexual; contiene vitaminas y sustancias minerales.

Calcium phosphoricum: Deficiencia de calcio, trastornos del crecimiento óseo.

China: Tónico para el agotamiento general y enfermedad con impotencia subsiguiente.

Cinnamomum: Hemorragias, inclinación a las hemorragias.

Hydrastis: Aumenta el tono con pérdida de peso condicionada por enfermedad.

Magnesium phosphoricum: Estabilización del sistema nervioso central, dolores y espasmos de los nervios y de los músculos, neuralgia.

Nux vomica: Dolores lumbares fuertes que empeoran estando sentado y por la noche, también al levantarse por la mañana.





Panax ginseng: Estados de agotamiento de todas las clases; contiene vitaminas B1 B2 (tiamina y riboflavina), así como componentes minerales con una alta cuota de sulfuro.

En casos de:

Agotamiento nervioso, neurastenia y agotamiento psicofísico asociado a estrés prolongado se utiliza Vita C 15 Forte.





PHARMAZEUTISCHE FABRIK

DR. RECKEWEG & CO.

B E N S H E I M

GMBH



www.xeniuspharma.cl